

Passeio a cavalo na Serra – Texto

Nos nossos passeios pela floresta cruzamo-nos com grande variedade de cogumelos, alguns de uma rara beleza. Na nossa região, aparecem após as primeiras chuvas do Outono e prolongam-se até à Primavera. Vamos apresentar-vos fotografias de exemplares das principais famílias para que os possam reconhecer, mas de modo algum apanhar, pois alguns podem matar-nos, se ingeridos, claro.

Verão: Amanitas, Boletos, Lactários, Tricolomas, Cantarelos, Rússulas, Psaliotas (Agáricos), Lepiotas ...

AMANITAS



(*amanita caesarea*)



(*amanita muscaria*)



(*amanita phalloides*)



(*amanita pantherina*)



(*amanita gemmata*)



(*amanita rubescens*)

BOLETOS



(boletus aereus)



(boletus purpuraceus)



(Boletus chrysenteron)

LACTÁRIOS



(lactarius chrysorrheus)



(lactarius volemus)



(lactarius deliciosus)

TRICOLOMAS



(tricholoma equestre)



(tricholoma nudus)



(tricholoma sulfureum)

CANTARELOS



(cantharellus cibarius)



(cantharellus lutescens)



(craterellus cornucopioides)

RÚSSULAS



(russula cyanoxantha)



(russula sardonia)



(russula aurata)

PSALIOTAS (AGARICOS)



(psalliota xanthoderma)



(psalliota radicata)



(psalliota vaporaria)

LEPIOTAS



(lepiota proscera)



(lepiota naucina)



(lepiota excoriatus)

ARMILARIAS



(armillaria mellea)

CLASTRUS



(clathrus cancellatus)

CLAVARIA



(clavaria cinerea)

ENTOLOMAS



(entoloma lividum)

NEMATOLOMAS



(nematoloma fasciculare)

HIDNES



(hydnum imbricatum)

Obs: apenas se apresentam os nomes botânicos uma vez que os nomes vernáculos variam de região para região.

Bom passeio!

Nota: As fotografias são da autoria de João Mateus e a edição de João e Maria Mateus